

FICHA TÉCNICA

K-FOL®

Nro de Registro : 227 -F- AGR- P

Titular de registro: ARYSTA-LIFESCIENCE ECUADOR S.A.

DESCRIPCIÓN

K-FOL es un fertilizante foliar altamente soluble diseñado especialmente para utilizarse en la fase de fructificación de los cultivos, y caracterizado por su alta concentración de **Fósforo** y **Potasio**, sin Nitrógeno.

COMPOSICION GARANTIZADA

ELEMENTO	% (p/p)
Fósforo Asimilable (P_2O_5)	20.0
Potasio Soluble en Agua (K_2O)	55.0
Fitohormonas	10.60 ppm

CARACTERISTICAS

Tipo de producto:	Fertilizante Foliar
pH en solución al 5%:	8.7
Solubilidad a 20 °C :	20 g en 100 ml de agua
Humedad:	Menor a 1%
Apariencia:	Cristales finos y polvo de color beige.
Presentaciones:	1 KG, 10 KG, 20 KG, 25 KG

BENEFICIOS

K-FOL® contiene primordialmente una alta concentración de Potasio, el cual interviene en la formación de carbohidratos, influencia la síntesis de proteínas, activa la producción de enzimas, ayuda a regular la transpiración e incrementa la resistencia de las plantas al ataque de patógenos e insectos. La aplicación de **K-FOL** asegura una mayor consistencia, calidad y tamaño de frutos y granos en diferentes cultivos. En ornamentales, su aplicación mejora el tamaño y calidad de la flor.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
ROSAS (<i>Rosa sp.</i>)	1.5 kg / ha en 1500 litros de agua	Aplicar en el desarrollo como complemento al programa de fertirriego	Aplicación Foliar Cada 15 días
TOMATE RIÑÓN (<i>Solanum lycopersicum</i>)	1.5 kg / ha en 600 litros de agua	Aplicar al inicio de la floración	Aplicación Foliar Cada 15 días
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	0.5 kg / en 200 litros de agua	Aplicar desde el inicio de la floración hasta máxima floración.	Aplicación foliar Cada 15 días
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	1.0 kg / ha en 200 litros de agua	Aplicar al inicio del espigamiento (5 %)	Aplicación foliar Una sola aplicación
SOYA (<i>Glycine max</i>)	1.0 kg / ha en 200 litros de agua	Aplicar entre R-1 y R-5	Aplicación foliar Cada 15 días
FRUTALES	2.0 kg / ha en 600 litros de agua	Aplicar 30 días después de formado el fruto y realizar tres aplicaciones	Aplicación foliar Cada 15 días
CAFÉ (<i>Coffea spp</i>)	1.0 kg / ha en 200 litros de agua	Aplicar entre los 90 y 100 días después de floración/inicio de formación de fruto	Aplicación foliar Una sola aplicación
HORTALIZAS	0.5 kg / en 200 litros de agua	Aplicar al inicio de llenado	Aplicación foliar Cada 15 días
BANANO (<i>Musa acuminata AAA</i>)	1 - 2 kg/ha	Aplicar durante la fase reproductiva desde aparición de la bellota	Aplicación foliar Cada 20 días
MAÍZ (<i>Zea mays</i>)	1 kg/ha	Aplicar en fase vegetativo V7/V8 y Reproductiva R1	Aplicación foliar

CAÑA DE AZUCAR (<i>Saccharum officinarum</i>)	1 - 1,5 kg/ha	Aplicar en estado reproductivo 60 días antes de la cosecha	Aplicación foliar
BROCOLI (<i>Brassica oleracea</i> var. itálica)	1 - 2 kg/ha	Etapa productiva a partir de etapa 6	Aplicación foliar Cada 7 días
MANGO (<i>Mangífera indica</i>)	1 - 1,5 kg/ha	Etapa reproductiva a partir de la formación de frutos	Aplicación foliar Cada 20 días

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

K-FOL es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de uso común, sin embargo se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda.

Este producto no es fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

- Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad de producto según las dosis recomendadas anteriormente y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua.
- Utilice agua limpia durante la aplicación.
- Agite la mezcla antes y durante la aplicación.
- Aplique con el volumen de agua y la presión suficiente de tal manera que se asegure un buen cubrimiento.

OBSERVACIONES AMBIENTALES

- Evite verter este producto en canales de aguas lluvias o al suelo.
- No lave los equipos de aplicación en las fuentes de agua.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado.

FABRICADO POR:



GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO S.A. de C.V.
 Blvd. Jesús Valdés Sánchez 2369 - Fracc. Europa C.P. 25290
 Saltillo, Coahuila – México.
 Phone: 52(844) 438 0500