



Fungicida

Respiración – Inhibidor Externo de la Quinona (Código 11)

Sistémico, translaminar y locosistémico – Preventivo, Curativo y Antiesporulante



FICHA TÉCNICA – Protección Vegetal

RSCO-FUNG-0386-X0247-064-22.95

Clasificación: Plaguicida Químico.
Ingrediente Activo: Azoxystrobin.
Composición: 22.95% en peso, equivalente a 250.15 g i.a./L.
Formulación: Suspensión Concentrada.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 4 (Oral: 2,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Cultivos	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Mango (0 días)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	0.5 - 0.7 L/ha	3	14 días	400 - 500 L/ha
Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Zarzamora (0 días)	Cenicilla polvorienta (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0.5 - 1.0 L/ha	3	7 días	543 - 643 L/ha
Aguacate (0 días)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	0.3 - 0.6 L/ha	2	14 días	1000 L/ha
Ajo, Cebolla, Cebollín, Poro (0 días)	Mildiu (<i>Peronospora destructor</i>) Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	0.4 - 1.0 L/ha	2	7 días	450 L/ha
Calabaza, Calabacita, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (1 día)	Cenicilla (<i>Golovinomyces cichoracearum</i> = <i>Erysiphe cichoracearum</i>)	0.4 - 1.0 L/ha	2	7 días	400 L/ha
Calabaza, Calabacita, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (1 día)	Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0.4 - 1.0 L/ha	2	7 días	400 - 450 L/ha
Berenjena, Chile, Papa, Pimiento morrón, Jitomate (tomate rojo) Tomate verde (1 día)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i> = <i>Oidiopsis taurica</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>) Mancha gris (<i>Stemphylium solani</i>)	0.3 - 0.6 L/ha	2	7 días	400 - 450 L/ha
Lima, Limón mexicano, Limón persa, Mandarina, Naranja, Tangerino, Toronjo (0 días)	Antracnosis (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	0.3 - 0.8 L/ha	2	7 días	500 L/ha
Plátano (0 días)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.2 - 0.5 L/ha	2	7 días	Drone: 15 L/ha (Drone) Aérea: 25 L/ha + aceite mineral Terrestre: 200-400 L/ha

Tiempo de reentrada: 24 h.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: Los indicados para cada cultivo (días).

Límite máximo de residuos: Consultar las tolerancias establecidas para México y el país destino de los productos cosechados.

Intervalo entre aplicaciones: 7 y 14 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Acondicione el agua a un pH de 5 a 5.5 para una mejor acción del producto. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua que contendrá la mezcla.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación. Actúa de forma preventiva y curativa, inhibidor de la germinación de esporas, además, impide el crecimiento micelial y muestra actividad antiesporulante. Realice las aplicaciones en forma preventiva, antes de observar los primeros síntomas de la presencia de la enfermedad y cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo, asegurándose que el producto tenga contacto con los tejidos expuestos a la enfermedad. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso. Agite la mezcla cada vez que recargue el aspersor para asegurar una mezcla homogénea. Realice las aplicaciones en horas tempranas del día o al atardecer.

Compatibilidad: Compatible con argemónina, berberina, ricinina y α -terthienil, clorotalonil, aminoácidos libres, extracto de gobernadora, sales potásicas de ácidos grasos, extracto del aceite de neem, gluconato de cobre, estreptomycin y oxitetraciclina. Cuando se desconozca la compatibilidad con otro producto, realice una prueba física previa para evitar efectos no deseados. Cuando requiera mezclarlo con otros productos, deberá hacerlo con aquellos registrados para los cultivos recomendados en su etiqueta.


Contraindicaciones: No aplique en soluciones de aspersión con pH superior a 7 debido a que puede sufrir degradación. Evite aplicarlo en suelos con textura arenosa para evitar lixiviación. Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 5 a 5.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar



- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.


Secuencia para la Aplicación

MdA Secuencia MdA Alternancia MdA Mezcla



- No aplique sub-dosis, aplique la dosis indicada en el patrón de uso.
- Realice mezclas, secuencias o alternancias, con fungicidas de diferentes modos de acción para minimizar la selección de resistencia.
- Mezcle con fungicidas Multisitio (código M) en la misma aplicación, y alterne con ingredientes activos de diferentes modos de acción.
- Limite el número de aplicaciones consecutivas en el programa de control.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cono para un espectro de gotas de mediana (M) a gruesa (C).
- Tamaño de gota media a gruesa, de 177 µm a 349 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 20 a 30 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el tejido a proteger.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquímia.com

Elaboración: 27-Nov-2019.
Actualización: 23-Jul-2024.
Versión: 03.
Página: 1 de 1.