



**Benzoato de emamectina**  
**Insecticida / Concentrado Emulsionable**

**RSCO-INAC-0102M-X0269-009-1.79**

**LUC**

**COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO**

**INGREDIENTE ACTIVO:**

**Benzoato de emamectina:** Mezcla de Emamectina B1a y Emamectina B1b (Contenido no menos de 83% de Emamectina B1a y no mas del 2% de Emamectina B1b) ..... **1.79%**

**INGREDIENTES INERTES:**

Humectante, antiespumante, cosolvente y solvente ..... **98.21%**  
**TOTAL** ..... **100.0%**



**NOCIVO SI SE INHALA**

**“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“INSTRUCCIONES DE USO”**  
**“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

**INFORMACIÓN GENERAL:**

**SUPER RAPTOR**, es un insecticida formulado como concentrado emulsionable perteneciente al grupo de las lactonas macrocíclicas derivado de la fermentación del microorganismo *Streptomyces avermitilis*, con actividad translaminar y actúa principalmente por ingestión y contacto directo. Se aplica diluido en agua en forma de aspersión directamente al follaje en los cultivos que aquí se indican:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS ML/HA	OBSERVACIONES
Maíz, Sorgo, Trigo (7)	Gusano cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	100 - 200	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días; iniciar las aplicaciones cuando se detecte la presencia de larvas; volumen de aplicación 343-443 L de agua/Ha.

**( ) INTERVALO DE SEGURIDAD:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS:** 12 horas después de la última aplicación.

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Para realizar esta operación use el equipo de protección personal adecuado (overol impermeable con capucha, mascarilla equipada con cartuchos contra vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Antes de usar el producto agite el envase. Abra el envase con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción).

Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Llene el tanque de aplicación hasta  $\frac{3}{4}$  partes de la cantidad total de agua a utilizar. Con ayuda de una probeta mida la cantidad de **SUPER RAPTOR**, a utilizar y vierta en un recipiente limpio por separado para realizar una premezcla, agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la premezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor, agregue la cantidad de agua faltante, cierre el tanque completamente y agite hasta mezclar perfectamente. Aplique el producto. Vuelva agitar el tanque antes de volver a usarlo, si se interrumpe momentáneamente el tratamiento. La mezcla debe de ser aplicada el mismo día. Se recomienda utilizar un volumen de agua entre 343-443 L/ha, en los equipos convencionales de aspersión.

**CONTRAINDICACIONES:** No se aplique en horas de calor intenso. No aplicar cuando la velocidad del viento sea fuerte, (más de 15 km/h) o si existe alta probabilidad de lluvia.

**FITOTOXICIDAD: SUPER RAPTOR**, no es fitotóxico siguiendo las dosis recomendadas para cada cultivo.

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar **SUPER RAPTOR**, con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

**PRESENTACIONES DISPONIBLES:** 100 ML, 1 L.