



META

URSUS®

Metamidofós

Insecticida / líquido miscible

RSCO-INAC-0144-401-012-051

P

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Metamidofós: O,S-Dimetil fosforoamidatoato No menos de: ... **51.01%**
(Equivalente a 600 g de i.a. / L)

INGREDIENTES INERTES:

Solventes, emulsificantes y compuestos No más de: **48.99%**
relacionados

TOTAL: **100.0%**



MORTAL SI SE INHALA

“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

URSUS META es un insecticida acaricida de contacto y residual. Se usa ampliamente en el control de áfidos, ácaros, pulguilla y muchas especies de larvas de lepidópteros en cultivos de nabina, algodón, lechuga y patatas. Su actividad sistemática se puede apreciar en la aplicación en la base o el tronco de árboles deciduos.

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS L/HA
Algodonero (50)	Trips	<i>Frankliniella sp.</i>	0.75 - 1.0
	Trips negro	<i>Caliothrips phaseoli</i>	
	Chinche apestosa	<i>Chlorochroa ligata</i>	1.0
	Chinche manchadora	<i>Dysdercus sp.</i>	
	Gusano de la hoja	<i>Alabama argillacea</i>	
	Gusano peludo	<i>Estigmene acrea</i>	
	Mosquita blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	1.0 - 1.5
	Pulga saltona negra	<i>Spanagonicus albofasciatus</i>	
	Pulgón del algodón y del Melón	<i>Aphis gossypii</i>	
	Chinche	<i>Nezara viridula</i>	
Berenjena (14)	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	1.0 - 1.5
	Araña roja	<i>Tetranychus spp.</i>	
	Falso medidor de la col	<i>Trichoplusia ni</i>	1.0 - 2.0
	Araña roja	<i>Tetranychus sp.</i>	
	Gusano del fruto	<i>Heliothis zea</i>	
Chile (14)	Gusano falso medidor de la col	<i>Trichoplusia ni</i>	1.0 - 1.5
	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	
	Pulgón mizus	<i>Myzus persicae</i>	1.0 - 1.5
	Gusano falso medidor de col	<i>Trichoplusia ni</i>	
	Minador de la hoja	<i>Liriomyza spp.</i>	
	Mosquita blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	
	Pulgón mizus	<i>Myzus persicae</i>	
	Araña roja	<i>Tetranychus spp.</i>	
	Diabrotica o doradilla	<i>Diabrotica spp.</i>	
	Chicharrita del betabel	<i>Eutettix tenellus</i>	
	Gusano del fruto	<i>Heliothis zea</i>	
	Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	
	Gusano trozador	<i>Agrotis malefida</i>	
	Pulga saltona	<i>Epitrix sp.</i>	

Col (35)	Chinche arlequín de la col Palomilla dorso de diamante Gusano del corazón de la col Falso medidor de la col Pulgón de la col Pulga saltona Gusano rayado Mariposa blanca de la col	<i>Murgantia histrionica</i> <i>Plutella xylostella</i> <i>Copitarsia consuetata</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Brevicoryne brassicae</i> <i>Phyllotreta sp.</i> <i>Leptophobia aripa</i> <i>Artogeia rapae</i>	1.0 - 1.5 1.0
Brócoli (14) Coliflor (28) Col de Bruselas (14)	Chinche arlequín de la col Gusano soldado Mariposita Blanca de la col Palomilla dorso de diamante Gusano del corazón de la col Falso medidor de la col Pulgón de la col Pulga saltona Gusano rayado	<i>Murgantia histrionica</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Artogeia rapae</i> <i>Plutella xylostella</i> <i>Copitarsia consuetata</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Brevicoryne brassicae</i> <i>Phyllotreta sp</i> <i>Leptophobia aripa</i>	1.0 - 1.5
Papa (14)	Catarinita de la papa Falso medidor de la col Gusano soldado Gusano trozador Mosquita blanca Palomilla de la papa Pulgón mizus Pulgón de la papa Pulguilla de la papa	<i>Leptinotarsa undecemlineata</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Agrotis sp.</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Phthorimaea operculella</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum solanifolii</i> <i>Epitrix sp.</i>	1.0 - 1.5 1.0
Melón Pepino (7)	Gusano del fruto Falso medidor de la col Minador de la hoja Pulgón del melón Mosquita blanca	<i>Heliothis zea</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Liriomyza sp.</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	1.0 - 1.5
Tomate de cáscara (7)	Araña roja Chicharrita del betabel Chinche ligus Diabrotica o doradilla Gusano del fruto Gusano soldado	<i>Tetranychus sp.</i> <i>Eutettix tenellus</i> <i>Lygus sp.</i> <i>Diabrotica sp.</i> <i>Heliothis zea</i> <i>Spodoptera</i>	 1.0 1.0 - 1.5
Tabaco (SL)	Gusano de cuerno del tabaco Gusano de la yema del tabaco Gusano falso medidor de la col Gusano peludo Mosquita blanca Pulga saltona negra	<i>Manduca sexta</i> <i>Heliothis virescens</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Estigmene acrea</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Epitrix hirtipennis</i>	1.0 - 1.5
Lechuga (14)	Gusano falso medidor Gusano soldado Pulgón mizus	<i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Myzus persicae</i>	1.0
Jitomate (tomate) (7)	Chicharrita del betabel Pulga negra Chinche del Jitomate Diabrotica o doradilla Gusano del cuerno del jitomate Gusano del fruto Pulgón mizus Araña roja Falso medidor de la col Gusano soldado Minador serpentina del chile Trips de las flores	<i>Eutettix tenellus</i> <i>Halticus sp.</i> <i>Cyrtopeltis notatus</i> <i>Diabrotica sp.</i> <i>Manduca quinquemaculata</i> <i>Heliothis zea</i> <i>Myzua persicae</i> <i>Tetranychus sp.</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Liriomyza munda</i> <i>Frankliniella tritici</i>	 0.75 - 1.0 1.0 1.0 - 1.5

() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

SL: Sin Límite.

Tiempo de re-entrada a zonas tratadas: 24 h.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Utilizando siempre el equipo de protección personal sostenga el recipiente, presione y gire la tapa en sentido contrario de las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad. Llene a la mitad de su capacidad con agua; mida la dosis del producto con una probeta graduada y agregue al tambor, complete la cantidad de agua a utilizar y mezcle con la ayuda de un palo o agitador. Debe utilizarse cantidad suficiente de aspersión para cubrir perfectamente el cultivo. Para aplicación terrestre NO emplear menos de 200 L/ ha. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en los envases originales y guardarse bajo llave para su uso posterior. El equipo de aplicación debe ser lavado en la orilla del mismo campo tratado. Se recomienda iniciar las aplicaciones cuando aparezcan las plagas y repetir si es necesario, usualmente dentro de los próximos 7 a 10 días.

CONTRAINDICACIONES

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 Km/h). No pastorear ganado en áreas tratadas.

FITOTOXICIDAD

URSUS META no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas. sin embargo, deberá aplicarse respetando las indicaciones de uso recomendadas en la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Es compatible con agroquímicos de uso común. Cuando se desconozca la compatibilidad con alguna mezcla, deberá realizarse una prueba previa. Las mezclas con otros productos serán con aquellos que tengan registro vigente y que estén autorizados para los cultivos aquí indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.