



Insecticida

Modo de Acción Desconocido o Incierto
Contacto



FICHA TÉCNICA - Protección Vegetal

RSCO-INAC-0103Y-0266-009-90

Clasificación: Plaguicida Botánico.
Ingrediente Activo: Extracto de chicalote (*Argemone mexicana*).
Composición: 90.00% en peso, equivalente a 831.60 g i.a./L.
Formulación: Concentrado Emulsionable.
Toxicidad: Categoría Toxicológica 5 (Oral: >5,000 mg/kg).

Patrón de Uso

Autorizado en Programas Inocuos o Certificados Orgánicos

Cultivo	Plaga	Dosis	Aplicaciones	Intervalo	Volumen
Aguacate (SL)	Araña roja del haz (<i>Oligonychus punicae</i>)	1.0 - 3.0 L/100 L de agua	3	7 días	170 - 270 L/ha
Berenjena, Chile, Chile habanero, Jitomate, Papa, Pimiento, Tomate de cáscara (SL)	Adultos de mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	2.0 - 3.0 L/ha	3	7 días	
Pepino, Calabaza, Calabacita, Chayote, Melón, Sandía (SL)	Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>)	1.0 - 3.0 L/ha	3	7 días	454 - 625 L/ha
Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Zarzamora (SL)	Mosca del vinagre de las alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	2.0 - 3.0 L/200 L de agua	3	7 días	
Lima, Limonero, Mandarino, Naranja, Pomelo, Tangerino, Toronjo (SL)	Pulgón café (<i>Toxoptera citricida</i>)	500 - 1500 mL/100 L de agua	3	7 días	

Tiempo de reentrada: Esperar a que seque el rocío de la aplicación (4 h).

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).

Límite máximo de residuos: Exento.

Intervalo entre aplicaciones: 7 días.


Preparación del producto: Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 6 a 6.5. Utilice recipientes plásticos para realizar la mezcla. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. El volumen de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.

Aplicación del producto: Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación. Se recomienda realizar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. Procure que el producto tenga contacto con los insectos, que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de sitios donde se localiza la plaga. Aplique la dosis mayor en infestaciones altas y cuando el follaje sea denso. Puede aplicarse durante la floración y durante la fructificación.

Compatibilidad: Este producto es compatible con sustancias alcalinas, oxidantes y/o reductoras. Este producto no debe mezclarse con otros productos; sin embargo se recomienda hacer pruebas preliminares de compatibilidad física y/o de fitotoxicidad.


Contraindicaciones: Evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva del producto.

Acondicionamiento del Agua




- Corrija la dureza para obtener agua blanda (0 a 75 ppm de CaCO_3).
- Acondicione el agua para un pH de 6 a 6.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Realice la mezcla al momento de la aplicación.
- Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Alternativa para prevenir o retrasar el riesgo de resistencia.
- No comparte un punto de acción común con otros compuestos y puede ser aplicado libremente.
- Efectivo para realizar secuencias, alternancias o mezclas con insecticidas de diferentes modos de acción.

Densidad de la Cobertura



- Utilice boquillas de cona.
- Tamaño de gota fina a media, de 136 µm a 218 µm (DVM).
- Asegure una densidad de cobertura de 50 a 70 gotas/cm².
- Confirme la cobertura en el envés.



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptigrupoultraquimia.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

07-Abr-2010.
13-Jul-2022.
05.
1 de 1.